



Binyrebarkutredning Katt

Dexamethason suppresjonstest – KATT

Primærindikasjon: Mistanke om Cushings sykdom (HA).

1. 0-prøve (>1 mL serum)
2. Injiser 0,1 mg/kg deksametason iv (Fortecortin® 4 mg/mL*)
3. Nye serum prøver (>1 mL serum) 4 og 8 timer etter injeksjon av dexamethason

* 1 mL Fortecortin® (4 mg/mL) fortynnes med isotonisk saltvann til 10 mL.
0,25 mL/kg av denne løsningen (0,04 mg/mL) gis iv.
Fortecortin® fås på registreringsfritak (erstatning for Decadron).

Tolkning av prøvesvar (4 og/eller 8 timers prøve(r)):

Ikke HA: <30 nmol/L

HA: >40 nmol/L

ACTH stimuleringstest - KATT

Primærindikasjon: Mistanke om Cushings sykdom (HA) eller iatrogen Cushings sykdom ("HA")

NB! Lavere sensitivitet (flere falske negative resultater) enn dexametason testen.

1. 0-prøve (>1 mL serum)
2. Injiser 0,125mg ACTH im (Synacthen® 0,25 mg/mL)
3. Ny serum prøve (>1 mL serum) 30 minutter og 1 time etter injeksjon av ACTH

Tolkning av prøvesvar:

Ikke "HA": < 415 nmol/L

"HA": >525 nmol/L